



Doporučení chovatelů

Ulcerovet pomohl mnoha koním dostat se ze začarovaného kruhu opakující se léčby žaludečních vředů pomocí inhibitorů protonové pumpy (léky snižující sekreci žaludeční kyseliny). Pomohl rovněž úspěšně léčit žaludeční problémy přímo bez použití těchto klasických léků. Ve většině případů se první zlepšení symptomů objeví během 2 týdnů podávání. Na rozdíl od léčby pomocí inhibitorů protonové pumpy tyto účinky přetrvávají. Ulcerovet je velmi účinnou alternativou léčby žaludečních vředů u koní, která nezpůsobuje sekundární problémy, jako je dysbióza a zánětlivé onemocnění střev.

www.vet.energy

 ENERGY

ULCEROVET

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – PRÁŠEK



PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA



DOPORUČENO
VETERINÁŘI



PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

ULCEROVET

*Přípravek obsahující standardizovaný prášek z natě rostliny *Maytenus ilicifolia*, která působí příznivě při léčbě žaludečních vředů u koní. Chrání žaludeční sliznici před poškozením tím, že snižuje sekreci žaludeční kyseliny a stimuluje produkci prostaglandinu. *Maytenus* má také protizánětlivý a analgetický účinek.*

ÚČINKY

- » Snižuje symptomy bolesti při výskytu žaludečních vředů u koní.
- » Protizánětlivý a analgetický účinek – chrání žaludeční sliznici snížením produkce kyseliny chlorovodíkové a stimulačí produkce prostaglandinu (tvorba ochranného hlenu).
- » Snižuje množství bakterií zapojených do zánětlivé reakce, a normalizuje tím žaludeční i střevní mikrobiom.

POUŽITÍ

- » Léčba žaludečních vředů u koní (snižuje sekreci žaludeční kyseliny a stimuluje produkci prostaglandinu).

- » Při podávání léků proti bolesti nebo při podávání antibiotik.
- » Preventivně při stresu.
- » Při nedostatečné účinnosti inhibitorů protonové pumpy.

SLOŽENÍ

100 % standardizovaný prášek *Maytenus ilicifolia*

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Denní dávka pro koně: 3–6 g. Prášek zalijte horkou vodou a promíchejte. Podávejte po vychladnutí.

Po třech týdnech užívání následuje 1 týden pauza.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

UPOZORNĚNÍ

Při akutních žaludečních vředech se poraďte s veterinárním lékařem. **Přípravek není náhradou veterinární péče a léčiv doporučených veterinárním lékařem.**

Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Není vhodný pro gravidní samice. Ukládejte mimo dosah dětí!

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

A INTERAKCE

Nedochází k nežádoucím účinkům vlivem trvalé změny pH žaludeční šťávy, jako je tomu u inhibitorů protonové pumpy.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek je nutno skladovat

v suchu a temnu, uchovávat při teplotě 10–25 °C a chránit před mrazem. Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu a na etiketě.

OBSAH

150 g